

بيان صحفي

جهة الاتصال HCA Communications
press@ochca.com
(714) 834-2178

النشر الفوري: 29 سبتمبر 2025

تسجيل حالة حصبة في مقاطعة ORANGE

(سانتا آنا، كاليفورنيا CA) – أعلنت وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة (HCA) Orange عن تأكيد إصابة طفل صغير بالحصبة بعد سفره داخل الولايات المتحدة. تقوم HCA بإخطار الأشخاص الذين تعرضوا للطفل أثناء وجوده في إحدى المنشآت الصحية. ولا يُعتقد بوجود أي تعرض إضافي داخل المجتمع، إذ التزمت عائلة الطفل بالعزل خلال فترة العدوى.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم تسجيل 1,514 حالة مؤكدة من الحصبة في الولايات المتحدة هذا العام، منها 23 حالة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، وهو أعلى عدد من الإصابات السنوية منذ أكثر من 30 عامًا.

صرحت الدكتورة **Regina Chinsio-Kwong**، مسؤولة الصحة في المقاطعة قائلة: "الحصبة فيروس شديد العدوى قد يسبب أمراضًا خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، وتورم الدماغ، وحتى الوفاة، خصوصًا لدى الأطفال الصغار غير المحصنين". وأضافت قائلة: "في السنوات الأخيرة، احتاج نحو واحد من كل ثمانية مصابين بالحصبة في الولايات المتحدة إلى دخول المستشفى، وترتفع هذه النسبة إلى واحد من كل خمسة بين الأطفال دون سن الخامسة".

تشمل الأعراض الشائعة للمرض الحمى، والسعال، واحمرار العينين مع دموع، وطفحًا جلديًا يبدأ عادة من الرأس ثم ينتشر إلى باقي أنحاء الجسم. تُعد الحصبة أكثر الأمراض المعدية المعروفة، إذ تنتقل بسهولة شديدة عبر الهواء أو من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب. ويكون المصابون قادرين على نقل العدوى من نحو أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي إلى أربعة أيام بعد ظهوره.

وينبغي لأي شخص يشتبه بإصابته بالحصبة أن يتصل بمقدم الرعاية الصحية قبل الذهاب إلى العيادة، لتجنب تعريض الآخرين للعدوى. كما يجب على العاملين في المجال الصحي الإبلاغ فورًا عن أي حالة يُشتبه بإصابتها بالحصبة إلى HCA في مقاطعة Orange للحصول على الإرشادات اللازمة وتنسيق إجراءات الفحص.

وتبقى اللقاحات الوسيلة الأنجع للوقاية من الحصبة. تُبذَر عن لقاح الحصبة:

- تم إعطاء أكثر من 800 مليون جرعة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) حول العالم. وتؤكد عقود من الأبحاث والتجارب الواقعية أن هذا اللقاح فعال جدًا في الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.
- ورغم أن أي إجراء طبي لا يخلو تمامًا من المخاطر، فإن معظم الآثار الجانبية للقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية تكون خفيفة، مثل ألم بسيط في الذراع أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. أما ردود الفعل الخطيرة فهي نادرة للغاية، كما أن الحماية التي يوفرها اللقاح ضد الأمراض الخطيرة تفوق بكثير أي مخاطر محتملة.
- وتواصل وكالات الصحة العامة حول العالم، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، متابعة سلامة اللقاحات بدقة.
- كما توصي اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة العامة في كاليفورنيا (CDPH) بإعطاء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للوقاية من التعرض لهم.
- ويُعد تحصين جميع أفراد الأسرة — بمن فيهم الأطفال والمراهقون والبالغون — أفضل وسيلة لحماية الرضع الذين لا يزالون صغارًا لتلقي لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.
- ويُنصح بأن يتلقى الرضع الجرعة الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بين عمر 12 و15 شهرًا. تُعطى الجرعة الثانية من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عندما يبلغ الطفل من 4 إلى 6 سنوات، أي قبل الالتحاق بالمدرسة.
- توجد الحصبة في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
- ويُوصى بأن يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 شهرًا والمقبلون على السفر الدولي جرعة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية قبل السفر لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.
- أما الأطفال بعمر 12 شهرًا فأكثر والبالغون الذين لم يحصلوا على اللقاح من قبل، فينبغي أن يتلقوا جرعتين يفصل بينهما ما لا يقل عن 28 يومًا قبل السفر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الحصبة، تفضل بزيارة www.cdc.gov/measles أو www.ochealthinfo.com/measles.

نُبذة عن وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة Orange

تُعد HCA في مقاطعة Orange جهة صحية إقليمية متعددة التخصصات ومعتمدة رسميًا، تضطلع بمسؤولية حماية وتعزيز صحة الأفراد والأسر والمجتمع من خلال التعاون وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص. للتعرف على مزيد من الخدمات والموارد، تفضل بزيارة www.ochealthinfo.com.