



OC HEALTH CARE AGENCY

اطلاعیه مطبوعاتی

HCA Communications تماس بگیرید:
press@ochca.com
(714) 834-2178

برای انتشار فوری: 29 سپتامبر 2025

مورد ابتلا به سرخک در شهرستان ORANGE

(Santa Ana, CA) – سازمان مراقبت سلامت (HCA) OC یک مورد ابتلا به سرخک را در کودکی که اخیراً سفری در کشور داشته، تأیید کرده است. HCA به افرادی که در مراکز مراقبت سلامت در مواجهه با این کودک بوده‌اند، اطلاع‌رسانی می‌کند. از آنجا که خانواده کودک در طول دوره سرایت در قرنطینه بودند، گمان نمی‌رود که کودک در تماس بیشتری با جامعه بوده است.

طبق گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، امسال 1514 مورد ابتلا به سرخک تأیید شده در ایالات متحده وجود داشته که 23 مورد جدید آن در دو هفته اخیر گزارش شده است. این آمار بالاترین تعداد موارد گزارش شده سالانه در بیش از 30 سال اخیر است.

به گفته دکتر Regina Chinsio-Kwong، مسئول سلامت شهرستان: «سرخک یک ویروس بسیار مسری است که می‌تواند منجر به بیماری‌های سختی مانند ذات‌الریه، تورم مغز و حتی مرگ شود، به‌خصوص در کودکان خردسالی که واکسینه نشده‌اند.» «در سال‌های اخیر، تقریباً از هر 8 نفری که در ایالات متحده به سرخک مبتلا شدند، 1 نفر نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته است. در میان کودکان زیر 5 سال، این رقم به 1 نفر از هر 5 نفر افزایش می‌یابد.»

علائم شایع شامل تب، سرفه، قرمزی و آبریزش چشم‌ها، و بثورات پوستی است که معمولاً از سر شروع شده و سپس به سایر نقاط بدن گسترش می‌یابد. سرخک مسری‌ترین بیماری است که تا به حال شناخته شده و به راحتی از طریق هوا و تماس مستقیم با فرد آلوده منتقل می‌شود. افراد از حدود چهار روز پیش از بروز بثورات پوستی تا چهار روز پس از بروز آن، ناقل بیماری هستند.

هر کسی که گمان می‌کند ممکن است به سرخک مبتلا شده باشد، باید پیش از مراجعه به مطب پزشک با ارائه‌دهنده خدمات درمانی خود تماس بگیرد تا از قرار دادن دیگران در معرض بیماری جلوگیری کند. پزشکان باید هر مورد مشکوک به سرخک را بلافاصله به سازمان خدمات سلامت شهرستان OC گزارش دهند تا راهنمایی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای انجام آزمایش صورت گیرد.

واکسیناسیون همچنان موثرترین روش پیشگیری از سرخک است. درباره واکسیناسیون سرخک:

- بیش از 800 میلیون دوز واکسن MMR (سرخک، اوریون و سرخچه) در سراسر جهان تزریق شده است. دهه‌ها تحقیق و تجربه در دنیای واقعی نشان می‌دهد که این واکسن در پیشگیری از بیماری‌های سخت مانند سرخک، اوریون و سرخچه بسیار مؤثر است.
- اگرچه هیچ مداخله پزشکی کاملاً بی‌خطر نیست، بیشتر عوارض جانبی واکسن MMR خفیف هستند - مانند درد بازو یا تب خفیف. واکنش‌های شدید به ندرت اتفاق می‌افتد و فواید محافظت واکسن در برابر بیماری‌های خطرناک به مراتب بیشتر از خطرات آن است.
- سازمان‌های سلامت عمومی در سرتاسر جهان، از جمله CDC و سازمان جهانی بهداشت (WHO)، به‌طور مداوم واکسن‌ها را از نظر بی‌خطر بودن به‌دقت پایش می‌کنند.
- کمیته مشورتی CDC در زمینه رویه واکسیناسیون و اداره سلامت عمومی (California (CDPH توصیه می‌کنند که برای محافظت در برابر سرخک، اوریون و سرخچه، واکسن MMR تزریق شود.
- واکسیناسیون اعضای خانواده از جمله کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بهترین روش برای محافظت از نوزادانی است که هنوز کوچکتر از آن هستند که واکسن MMR دریافت کنند.
- نوزادان باید اولین دوز واکسن MMR خود را در سنین 12 تا 15 ماهگی دریافت کنند. دوز دوم واکسن MMR در سنین 4 تا 6 سالگی، قبل از رفتن به مدرسه، تزریق می‌شود.
- سرخک در بخش‌های زیادی از جهان گزارش شده است، از جمله اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه.
- برای کودکان 6 تا 12 ماهه‌ای که سفر بین‌المللی در پیش دارند، توصیه می‌شود قبل از سفر یک دوز واکسن MMR دریافت کنند تا خطر ابتلا به بیماری کاهش یابد.
- کودکان 12 ماهه و بالاتر و همچنین بزرگسالان، در صورتی که قبلاً واکسینه نشده باشند، باید قبل از سفر 2 دوز واکسن دریافت کنند، با فاصله حداقل 28 روز بین دوزها.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرخک، به www.cdc.gov/measles یا www.ochealthinfo.com/measles مراجعه کنید.

دربارۀ سازمان مراقبت سلامت OC

سازمان مراقبت سلامت (HCA) OC یک نهاد سلامت منطقه‌ای میان‌رشته‌ای و یک اداره سلامت معتبر است که مأموریت آن حفاظت و ارتقای سلامت فرد، خانواده و جامعه از طریق همکاری و هماهنگی منابع بخش‌های دولتی و خصوصی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و منابع، به www.ochealthinfo.com مراجعه کنید.