



OC HEALTH CARE AGENCY

# COMUNICADO DE PRENSA

**Para su publicación inmediata:** 29 de septiembre de 2025      **Contacto:** HCA Communications  
[press@ochca.com](mailto:press@ochca.com)  
(714) 834-2178

## CASO DE SARAMPIÓN EN EL CONDADO DE ORANGE

(Santa Ana, CA) – La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OC Health Care Agency, HCA) ha confirmado un caso de sarampión en un niño pequeño que viajó recientemente dentro del país. La HCA está notificando a las personas que estuvieron expuestas al menor en un centro de atención médica. No se sospecha exposición adicional en la comunidad, ya que la familia del niño se mantuvo aislada durante el período de contagio.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Disease Control and Prevention, CDC), este año se han confirmado 1.514 casos de sarampión en Estados Unidos, con 23 nuevos casos reportados en las últimas dos semanas. Esta cifra representa el número anual más alto de casos en más de 30 años.

“El sarampión es un virus altamente contagioso que puede causar enfermedades graves como neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte, especialmente en los niños pequeños que no están protegidos”, declaró la **Dra. Regina Chinsio-Kwong**, funcionaria de salud del condado. “En los últimos años, aproximadamente 1 de cada 8 personas diagnosticadas con sarampión en Estados Unidos ha requerido hospitalización. En los niños menores de 5 años, esa proporción aumenta a 1 de cada 5.”

Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, ojos rojos y llorosos, y un sarpullido que normalmente comienza en la cabeza antes de extenderse al resto del cuerpo. El sarampión es la enfermedad más contagiosa conocida y se propaga con gran facilidad por el aire o por contacto directo con una persona infectada. Las personas son contagiosas desde aproximadamente cuatro días antes de que aparezca el sarpullido hasta cuatro días después.

Cualquier persona que sospeche que puede tener sarampión debe llamar a su proveedor de atención médica **antes** de acudir al consultorio, con el fin de evitar exponer a otras personas. Los profesionales de la salud deben informar de inmediato cualquier caso sospechoso de sarampión a la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange para recibir orientación y coordinar las pruebas correspondientes.

La vacunación sigue siendo la forma más efectiva de prevenir el sarampión. Sobre la vacunación contra el sarampión:

- Se han administrado más de 800 millones de dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) en todo el mundo. Décadas de investigación y experiencia práctica demuestran que esta vacuna es altamente efectiva para prevenir enfermedades graves como el sarampión, las paperas y la rubéola.
- Aunque ningún tratamiento médico está completamente libre de riesgos, la mayoría de los efectos secundarios de la vacuna MMR son leves, como dolor en el brazo o fiebre baja. Las reacciones graves son poco comunes, y la protección que ofrece contra enfermedades peligrosas supera ampliamente los riesgos.
- Las agencias de salud pública de todo el mundo, incluidos los CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS), continúan monitoreando rigurosamente la seguridad de las vacunas.
- El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) recomiendan la vacunación con MMR para protegerse contra el sarampión, las paperas y la rubéola.
- Vacunar a todos los miembros del hogar, incluidos niños, adolescentes y adultos, es la mejor manera de proteger a los bebés que aún son demasiado pequeños para recibir la vacuna MMR.
- Los bebés deben recibir su primera dosis de la vacuna MMR entre los 12 y 15 meses de edad. La segunda dosis se aplica entre los 4 y 6 años, antes de comenzar la escuela.
- El sarampión está presente en muchas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia, África y Medio Oriente.
- Se recomienda que los niños de entre 6 y 12 meses de edad que viajen internacionalmente reciban una dosis de la vacuna MMR antes del viaje, para reducir su riesgo de infección.
- Los niños mayores de 12 meses y los adultos que no hayan sido vacunados deben recibir dos dosis, con al menos 28 días de diferencia, antes de viajar.

Para obtener más información sobre el sarampión, visite [www.cdc.gov/sarampión](http://www.cdc.gov/sarampión) o [www.ochealthinfo.com/sarampión](http://www.ochealthinfo.com/sarampión).

## **ACERCA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL CONDADO DE ORANGE**

La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (HCA) es una jurisdicción regional interdisciplinaria y un departamento de salud acreditado, encargado de proteger y promover la salud individual, familiar y comunitaria mediante la colaboración y coordinación de recursos públicos y privados. Visita [www.ochealthinfo.com](http://www.ochealthinfo.com) para obtener más información sobre servicios y recursos.

###